



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA Cedex  
Tél. 61 24 06 51

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
Abonnement annuel 115 F  
Sous-régisseur Recettes D D A. Hte-Gne  
CCP 8612-11 R Toulouse

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 12 DU 4 SEPTEMBRE 1986

## COLZA

### GROSSE ALTISE

*Une protection dès le semis est fortement conseillée. Se référer à la fiche ci-jointe pour le choix des produits.*

*Conserver cette fiche, il y sera fait référence tout au long de la campagne.*

### LIMACES

*Surveiller les cultures dès le semis et intervenir dans les zones infestées dès les premiers dégâts avec un des produits ci-dessous :*

- mercaptodiméthur (3 à 5 kg/ha selon les spécialités commerciales)
- métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)

### DESHERBAGE PRECOCE D'AUTOMNE

Le désherbage d'automne en pré-semis, pré-levée, voire post-levée précoce (stade cotylédons à première feuille) demeure la technique la plus sûre pour contrôler les principales mauvaises herbes de notre région.

Aucun produit nouveau à signaler depuis la campagne précédente pour ce type de désherbage.

Le tableau ci-après indique les produits à utiliser en fonction des mauvaises herbes habituellement présentes dans les parcelles de notre région.

7.1.44

# HERBICIDES PRECOCES D'AUTOMNE SUR COLZA

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose de spécialité commerciale à l'ha	Utilisation	Efficacité sur les principales adventices							
				Pâturin	Ray grass	Vulpin	Repousses de blé	Repousses d'orge	Stellaire	Matricaire	Véronique
AVANT LE SEMIS											
napropamide	DEVRI <sup>NOL</sup> FL	2,2 à 2,8 l	incorporer sur 2-3 cm au plus tard dans les 48 heures	●	0	●		0	●	●	●
napropamide + nitralin	ZULAN FULTON	2,5 kg		●	●	●	0	0	●	●	●
trifluraline	nombreuses spécialités	2,5 l	incorporer immédiatement sur 6 à 8 cm	●	0	●			●		●
diallate	AVADEX	3,5 à 4 l		●	●	●	4 l	4 l			
tébutam	COMODOR	4 à 5 l	incorporer sur 2 à 3 cm	●	●	●	● 5 l	● 5 l	●	●	● 5 l
ENTRE LE SEMIS ET LA LEVEE											
tébutam	COMODOR	4 à 5 l	préférer l'application en pré-semis en sol caillouteux ou par automne sec	●	●	●	● 5 l	● 5 l	●	●	● 5 l
métazachlore	BUTISAN 5	2 à 2,5 l	pulvériser après semis (non incorporé). En terre filtrante, baisser la dose à 2 l à cause du risque de phytotoxicité	●	●	●			●	●	●
dimétachlore	TERIDOX	2 à 3 l		●	●	0			0	●	●
APRES LA LEVEE											
métazachlore	BUTISAN 5	3 l	utiliser au stade "cotylédons étalés - 1ère feuille pointante" du colza	●	●	●			●	●	●

## Légende

● bonne efficacité     
 ○ efficacité moyenne     
   efficacité insuffisante

.../...